

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
n. 25 DEL 6 OTTOBRE 2017

OLIVO

PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

Vicenza e pedemontana		venerdì 6 pom/sera	sabato 7 mattina	sabato 7 pom/sera	domenica 8 mattina	domenica 8 pom/sera	lunedì 9	martedì 10
PREVISIONI prossimi 5 gg.	stato del cielo							
	temperatura	max 21/23 °C	min 8/10 °C max 20/22 °C		min 8/10 °C max 19/21 °C			
Bollettino ARPAV aggiornato al 6 ottobre h 13.00	precipitazioni	Rovesci o temporali	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
	probabilità precipitazioni	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	attendibilità previsione		Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima

Andamento meteo: Ultimo periodo connotato da un decorso quasi identico a quello precedente con un evento piovoso nella giornata di domenica (1-2 mm in tutto il territorio) che ha intervallato una settimana sostanzialmente stabile marcata da temperature che sono scese in occasione del maltempo fino a 16-17° C di massima per poi risalire fino a raggiungere i 20-22°C nella giornata di ieri. Rispetto alla norma i valori termici risultano inferiori di circa 1-1,3°C sulle massime e di 0,5-0,7°C sulle minime.

Stato fenologico e culturale: Primi accenni di colorazione della polpa sui frutti della cv. Leccino mentre le tardive, ovunque, sono nello stadio di invaiatura da piena ad avanzata. L'avanzamento di fase negli ultimi 7 giorni è stato più marcato che in precedenza ed è ormai prossimo l'inizio della maturazione delle varietà precoci.

Stato parassitario: Mosca – catture da basse ad assenti in questa settimana sia nei Berici-Lessini che nella pedemontana- bassanese (2-3 individui per trappola in media). Anche l'attività larvale è risultata praticamente nulla. **Cascola pre-maturazione** – qua e là, in entrambi i comprensori, si sta manifestando della cascola di drupe sulle piante più anticipate. I campioni raccolti ed esaminati al binoculare hanno escluso che le cause siano dovute a mosca o tignola.

Indirizzi di difesa:

In generale non c'è più alcuna necessità di interventi contro la mosca con prodotti larvicidi (Dimetoato ecc.). Solo laddove la produzione si raccoglierà tardivamente, per scelta o necessità, potrebbe ancora manifestarsi l'opportunità di un intervento ad azione adulticida più avanti (**Deltametrina o esche proteiche con Spinosad**) anche se la cosa sembra poco probabile.

Altre indicazioni: Data la scarsissima produzione stagionale è verosimile che i frantoiani saranno costretti a operare in un arco di tempo assai ristretto e centrato sulle esigenze medie della clientela. Pertanto, coloro che hanno subito grandinate e non hanno già provveduto, si affrettino a definire il calendario di raccolta con gli stessi per evitare, se possibile, una lavorazione tardiva delle loro produzioni.

Avvertenze: In corsivo sono riportati i principi attivi autorizzati in agricoltura biologica **SC**



Inizio colorazione polpa
Leccino (Carraro)



stadio Frantoio
(Carraro)



Lesioni da grandine
(Carraro)



Cascola prematurazione
(Carraro)